

CARBOPLATIN

Andere namen:

- Paraplatin, JM-8

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus in 30 minuten tot 24 uur gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken

Bijwerkingen op langere termijn:

- Haaruitval
- Verlaging van het aantal rode en witte bloedlichaampjes en vooral de bloedplaatjes (2 tot 4 weken na toediening)
- Nierbeschadiging
- Gehoorverlies
- Irritatie van de zenuwbanen, met als gevolg een 'doof' gevoel in of tintelende vingers en tenen

Speciale instructies:

- Waarschuw de arts als er een verandering in het gehoor van uw kind optreedt en/of als uw kind klaagt over oorsuizen.

Bijzonderheden:

- Dit medicijn kan nierbeschadiging geven. Voor, tijdens en na de toediening wordt bijgehouden hoeveel vocht er opgenomen en uitgescheiden wordt. Regelmatig zal er bloed en urine afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de nieren is.
- Dit medicijn kan doofheid veroorzaken. Regelmatig zal een gehoortest worden afgenomen ter controle.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.