

CICLOSPORINE

Andere namen:

- Sandimmune, Neoral

Wat is het:

- Een medicijn dat gegeven wordt om afstotingreacties tegen te gaan of auto-immuunziekten te onderdrukken.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een drank of een capsule die via de mond (oraal) ingenomen wordt.
- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) gegeven wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken

Bijwerkingen op langere termijn:

- Lever- en nierbeschadiging
- Verhoogde bloeddruk
- Tijdelijke toename van beharing op gezicht en lichaam en veranderingen in het gelaat, zoals dikke wangen
- Verhoogde kans op infectie, maagklachten, hoofdpijn
- Irritatie van zenuwbanen, met als gevolg een 'doof' gevoel in of tintelende vingers en tenen
- Beven van de handen
- Stuipen

Speciale instructies:

- Als uw kind na het innemen van dit medicijn braakt (binnen 30 minuten), overleg dan met de verpleegkundige of de capsule of het drankje opnieuw gegeven moet worden.

Bijzonderheden:

- Regelmatig zal er bloed afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de lever en de nieren is.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.