

CO-TRIMOXAZOL

Andere namen:

- Bactrimel, Eusaprim

Wat is het:

- Een antibioticum dat gegeven wordt om een bepaalde longontsteking (Pneumocystis carinii) te voorkomen of te behandelen.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een drank of een tablet die via de mond (oraal) ingenomen moet worden.
- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt.

Bijwerkingen op langere termijn:

- Overgevoeligheidsreactie van de huid (uitslag, jeuk)
- Buikpijn
- Bij langdurig gebruik verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes

Speciale instructies:

- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd zonnebaden en gebruik een anti-zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als u huidveranderingen bij uw kind bemerkt of als uw kind over jeuk klaagt.
- Als uw kind binnen 30 minuten na het innemen van dit medicijn braakt, overleg dan met de verpleegkundige of de tablet of het drankje opnieuw gegeven moet worden.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.