

IDARUBICINE

Andere namen:

- Zavedos, Idamycin

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een rode vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus wordt gegeven.

Bijwerkingen op korte termijn(binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Verkleuring van de urine, van rose tot rood (kan een aantal dagen duren)
- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt
- Diarree

Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal rode en witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes
- Ontstoken mondslijmvlies (3 tot 10 dagen na toediening)
- Haaruitval
- Kan bij hoge doseringen beschadiging van de hartspier veroorzaken
- Leverbeschadiging
- Verkleuring van de huid van een (eerder) bestraald gebied

Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens de toediening van dit medicijn, of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.

Bijzonderheden:

- Dit medicijn kan beschadiging van de hartspier geven. Er zal regelmatig een echocardiogram en/of electrocardiogram (ECG) ter controle gemaakt worden.
- Regelmatig zal er bloed afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de lever is.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.