

MITOXINE

Andere namen:

- Chloormethine, Mustine, Nitrogen Mustard, Stikstofmosterd

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als bolusinjectie in 3 tot 5 minuten gegeven wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt
- Metaalachtige smaak in de mond (tijdens en vlak na toediening)

Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal rode en witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening)
- Verkleuring van de ader(en) waarin het medicijn gegeven is
- Haaruitval
- Vermoeidheid en een grieperig gevoel

Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens toediening van dit medicijn, of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- Om de metaalachtige smaak die kan optreden tijdens het inspuiten van dit medicijn tegen te gaan, kunt u uw kind op een snoepje laten zuigen of kauwgom laten kauwen.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.