

TACROLIMUS

Andere namen:

- Prograft

Wat is het:

- Een medicijn dat het immuunsysteem onderdrukt. Het wordt gegeven om een afstotingsreactie na transplantatie tegen te gaan.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een capsule die via de mond (oraal) wordt ingenomen.
- Een doorzichtige vloeistof die via een ader (intraveneus) als injectie of infuus wordt gegeven.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Diarree, maag- en darmklachten

Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte en rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening)
- Koorts
- Verhoogde bloeddruk
- Hartritmestoornissen
- Suikerziekte
- Stooris van de electrolytenhuishouding
- Spierkrampen en pijn in gewrichten, ledematen en rug
- Hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizingen
- Tintelingen en doof gevoel in de handen of voeten
- Angst, verwardheid, depressieve gevoelens en stemmingswisselingen
- Slapeloosheid
- Kortademigheid en hoesten
- Lever- en nierfunctiestoornissen
- Huiduitslag, jeuk
- Haaruitval
- Zweten
- Verminderd gezichtsvermogen
- Verminderde eetlust
- Gewichtstoename

Speciale instructies:

- Inname op de lege maag 1 uur voor of 2 tot 3 uur na de maaltijd.
- De capsules mogen niet met grapefruitsap worden ingenomen omdat dit de werking van het medicijn kan beïnvloeden.
- Vermijd overmatige blootstelling van de huid aan zonlicht of UV-straling.

Bijzonderheden:

- Regelmatig wordt bloed afgenomen om te controleren of de dosering juist is en om bijwerkingen zoveel mogelijk te beperken.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als U een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.