

THYMOGLOBULINE

Andere namen:

- ATG, Antihumaan thymocytenoglobuline

Wat is het:

- Een medicijn dat de T-cellen van het immuunsysteem onderdrukt.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus wordt toegediend.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Allergische reactie tijdens of direct na toediening van het medicijn met als verschijnselen: temperatuurverhoging, rode huiduitslag, vasthouden van vocht, benauwdheid, verlaagde bloeddruk
- Duizeligheid

Bijwerkingen op langere termijn:

- Allergische reactie tot drie dagen na toediening van het medicijn (met bovengenoemde verschijnselen)
- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes.
- Dit kan langdurig zijn; dan is bescherming tegen infecties nodig.
- Reacties kunnen nog na weken optreden met gewrichtsklachten, spierpijn, koorts en huiduitslag (serumziekte). Daarvoor wordt prednison gegeven.

Speciale instructies:

- Tijdens en na toediening van het medicijn controleert de verpleegkundige bloeddruk, pols, ademhaling en temperatuur.
- Waarschuw de verpleegkundige bij rillingen, benauwdheid of huiduitslag.