



## **GEHOORAFWIJKINGEN**

### **Onderzoek**

Ieder kind met Fanconi anemie (FA) moet uitgebreid onderzocht worden op afwijkingen van het oor. Met regelmatige gehoortesten kan gehoorverlies tijdig opgespoord worden. In het algemeen geldt dat hoe eerder de behandeling start, des te minder schade er op lange termijn is. Wanneer slechthorendheid vóór de leeftijd van 6 maanden wordt ontdekt en behandeld, zijn de nadelige effecten op de taalontwikkeling minder en kan je kind op school met aanpassingen beter uit de voeten.

### **Behandeling**

Indien nodig wordt een hoortoestel aangemeten. Er zijn hoortoestellen voor allerlei soorten gehoorverlies en voor alle leeftijden, zelfs voor baby's. Naast permanente hoortoestellen bestaan er ook ondersteunende hoortoestellen (zogenaamde solo-apparatuur). Deze zijn te gebruiken op plekken met veel achtergrondgeluid, zoals klaslokalen en restaurants. Ze versterken het geluid dat je wil horen doordat de spreker een microfoon draagt en de luisteraar een ontvanger in het oor.

Bij abnormaal ontwikkelde of vergroeide gehoorbeentjes kunnen geluidstrillingen niet goed worden geleid. Er kan dan geleidingslechthorendheid ontstaan. Soms is een operatie mogelijk. Deze gebeurt bij voorkeur na het 7e levensjaar omdat kinderen dan minder vaak oorontsteking hebben. Als het binnenoor is aangedaan (perceptief gehoorverlies) is een operatie niet mogelijk en biedt alleen een hoortoestel uitkomst.

Patiënten die geen gehoorgang hebben en daardoor gehoorverlies kunnen in aanmerking komen voor een in het bot verankerd hoorapparaat.

### **Follow-up bij slechthorendheid**

Bij slechthorendheid wordt het gehoor regelmatig (jaarlijks) gecontroleerd. Als het gehoor niet stabiel is of bij andere problemen, is vaker controle noodzakelijk.

### **Controle gehoor algemeen**

Volwassen FA-patiënten bij wie geen gehoorproblemen geconstateerd zijn, moeten om de twee à drie jaar een gehoortest krijgen. Bij kinderen is de gehoortest vaker nodig. Sommige behandelingen kunnen het gehoor beïnvloeden. Het is daarom goed om het gehoor voor en na zo'n behandeling te testen.