



Epileptische aanval

Oorzaken

Een epileptische aanval, ook wel stuip genoemd, kan komen door een hersentumor of een neurologisch probleem.

Gevolgen

- Je kind is plotseling niet meer aanspreekbaar.
- Het kan trekkingen in het gezicht, de armen en/of de benen krijgen.
- De armen en/of de benen kunnen ook verstijven.
- Je kind kan op zijn tong bijten, overgeven of in zijn broek plassen.
- Een epileptische aanval duurt van minder dan een minuut tot enkele minuten.
- Na afloop is je kind een tijdje versuft. Dat is heel normaal.

Wat kun je zelf doen?

- Leg je kind op de zij, zodat eventueel braaksel uit de mond loopt en je kind zich niet verslikt.
- Controleer of er iets in de mond zit en verwijder dit (eten, kauwgom, snoep, speelgoed).

- Maak kleding rond de hals los en zorg voor frisse lucht.
- Neem op hoe lang de aanval duurt.
- Geef medicijnen als de aanval langer dan 1-2 minuten duurt en bel daarna je huisarts.
- Als de aanval langer dan 5 minuten duurt, overleg dan met je huisarts of je de medicijnen nog een keer moet geven of dat er iets anders moet gebeuren.

Let op

- Een epileptische aanval kan er akelig uitzien.
 - Als je kind kans op een epileptische aanval heeft, dan krijg je medicijnen in huis.
 - Je hoort ook wanneer en hoe je deze medicijnen moet geven. Meestal is dit via de neus of de anus (rectaal).
 - Vraag je (huis)arts om uitleg als je die nog niet hebt gekregen.
 - Als je kind verschillende aanvallen achter elkaar heeft gehad, overleg dan met je (huis)arts of het dagelijks medicijnen nodig heeft om een aanval te voorkomen.
-