



Laag aantal bloedplaatjes

Oorzaken

Door de tumor en de behandeling kan het aantal bloedplaatjes verlaagd zijn.

Gevolgen

Je kind kan blauwe plekken en puntbloedinkjes op de huid en in de mond krijgen. Ook kan het spontaan een bloedneus krijgen.

Wat kun je zelf doen?

Overleg met je (huis)arts of een bloedplaatjestransfusie mogelijk is als je met je kind bijvoorbeeld nog een uitstapje wilt maken.

Wat kun je zelf doen bij een bloedneus?

- Laat je kind rechtop zitten, liefst iets naar voren gebogen.
- Vraag het zijn neus goed te snuiten.
- Druk dan met duim en wijsvinger de neus net onder het neusbotje dicht.
- Doe dit gedurende tien minuten.
- Helpt dit niet, laat je kind dan opnieuw voorzichtig snuiten.
- Doe een gaasje (geen watten) doordrenkt met xylometazoline (Otrivin®) 0,1% of spongostan in het neusgat.

- Laat het gaasje een half uur zitten.
- Trek het daarna met een draaiende beweging uit de neus. Maak het nat als het vast zit.
- De spongostan laat je in de neus zitten, die lost vanzelf op.
- Bel je huisarts als de bloeding nog steeds niet gestopt is. Hij kan dan eventueel een neustampon plaatsen.

Let op

Omdat het effect van korte duur is, wordt een bloedplaatjestransfusie niet snel gegeven. Bovendien moet je kind daarvoor naar het ziekenhuis en dat is een extra belasting.

Bijzonderheden

- Met een gaasje bedoelen we een hydrofiel gaaskompres of een 'non woven' gaaskompres. Deze zijn verkrijgbaar bij de drogist of apotheek.
 - Xylometazoline (Otrivin®) en spongostan zijn verkrijgbaar bij drogist of apotheek.
-