

6-MERCAPTOPURINE

Andere namen:

- 6-MP, Puri-Nethol

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een tablet die via de mond (oraal) wordt ingenomen.
- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als een infuus wordt gegeven.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Huidveranderingen (rode uitslag)

Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes (5 dagen tot 6 weken na toediening)
- Ontstoken mondslijmvlies
- Leverbeschadiging

Speciale instructies:

- Als uw kind na het innemen van dit medicijn braakt (binnen 30 minuten), overleg dan met de verpleegkundige of de tablet opnieuw gegeven moet worden.
- De misselijkheid kan grotendeels voorkomen worden door de medicatie niet op een volle maag in te nemen, bij voorkeur 2 uur voor of 2 uur na de maaltijd.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als u huidveranderingen bij uw kind bemerkt of als uw kind over jeuk klaagt.

Bijzonderheden:

- Regelmatig zal er bloed afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de lever is.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.