

6-THIOGUANINE

Andere namen:

- 6-TG, Lanvis

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een tablet die via de mond (oraal) ingenomen moet worden.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Milde misselijkheid en braken
- Huidveranderingen (uitslag)

Bijwerkingen op langere termijn:

- Ontstoken mondslijmvlies
- Diarree
- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes
- Leverbeschadiging

Speciale instructies:

- Als uw kind na het innemen van dit medicijn braakt (binnen 30 minuten), overleg dan met de verpleegkundige of de tablet opnieuw gegeven moet worden.
- Bij voorkeur de tablet(ten) 2 uur voor of 2 uur na een maaltijd in laten nemen.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als u huidveranderingen bij uw kind bemerkt, of als uw kind over jeuk klaagt.

Bijzonderheden:

- Regelmatig zal er bloed afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de lever is.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.