

ADRIAMYCINE

Andere namen:

- Doxorubicine, Adriblastina

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een rode vloeistof die via een ader (intraveneus) als bolusinjectie in 3 tot 5 minuten of intraveneus als infuus gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt
- Misselijkheid en braken
- Roodkleuring van de urine (1 tot 2 dagen na toediening)
- Diarree

Bijwerkingen op langere termijn:

- Ontstoken mondslijmvlies (5 tot 10 dagen na toediening)
- Verlaging van het aantal rode en vooral witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (10 tot 14 dagen na toediening)
- Haaruitval
- Beschadiging van de hartspier
- Verkleuring of roodheid van de huid over de geïnjecteerde ader of van de (eerder) bestraalde huid
- Nagelveranderingen

Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens de toediening van dit medicijn via een infuus, of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd zonnebaden en gebruik een anti-zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.

Bijzonderheden:

- Dit medicijn kan beschadiging van de hartspier geven. Regelmatig zal er een electrocardiogram (ECG) en/of echocardiogram ter controle worden gemaakt.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.