

AMSACRINE

Andere namen:

- Amsidine, m-Amsa

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een oranje-bruine vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt
- Onregelmatige hartslag
- Koorts
- Oranjekleuring van de urine (1 tot 2 dagen na toediening)

Bijwerkingen op langere termijn:

- Ontstoken mondslijmvlies
- Diarree
- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes

Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens de toediening van dit medicijn via een infuus, of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.

Bijzonderheden:

- Als er bij uw kind een onregelmatige hartslag optreedt, kan het nodig zijn een elektrocardiogram (ECG) en/of een echocardiogram ter controle te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.