

# ASPARAGINASE

## Andere namen:

- L-asparaginase, L'ASP, Erwinase, Crasnitin, Oncospar (PEG)

## Wat is het:

- Een celdeling-remmend enzym

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die direct in een spier (intramusculair) of via een ader (intraveneus) als infuus in een aantal uren gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Algehele malaise (koorts, hoofdpijn)
- Overgevoeligheidsreactie binnen 1 uur (rillingen, koorts, hoesten, kortademigheid, roodheid van de huid, jeuk, verlaagde bloeddruk)

## Bijwerkingen op langere termijn:

- Gestoorde aanmaak van (stollings)eiwitten
- Suikerziekte (voorbijgaand)
- Lever- en alveesklierbeschadiging
- Koude rillingen, koorts en moeheid
- Neurologische stoornissen (bijv. verwardheid)

## Speciale instructies:

- Bij sommige patiënten kan er een overgevoeligheidsreactie optreden. De verpleegkundige zal de eerste uren tijdens en na de intraveneuze toediening van dit middel regelmatig de bloeddruk controleren.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als u een van bovenstaande overgevoeligheidsreacties bij uw kind bemerkt.

## Bijzonderheden:

- Regelmatig zal er bloed worden afgenomen om te onderzoeken hoe de werking van de lever en alveesklier is en hoe de stolling is.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.