

BCNU

Andere namen:

- Carmustine, Nitrumon, Carmubris

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken (tot enkele uren na de toediening)
- Tijdens toediening pijn (branderig gevoel) bij de insteekplaats
- 'Opvliegers' (rood gezicht) tijdens toediening

Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (3 tot 6 weken na toediening)
- Vermoeidheid
- Kan in uitzonderlijke gevallen leverbeschadiging geven
- Kan in uitzonderlijke gevallen longbeschadiging geven

Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens de toediening van dit medicijn via een infuus, of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind tijdens de toediening gaat hoesten of kortademig wordt.

Bijzonderheden:

- Dit medicijn kan longbeschadiging geven. Regelmatig zal er een longfoto gemaakt worden en/of een longfunctieonderzoek worden verricht ter controle.
- Regelmatig zal er bloed afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de lever is.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.