

BLEOMYCINE

Andere namen:

- Bleo, Blenoxane

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt. Deze medicatie kan ook direct in een spier (intramusculair) of onder de huid (subcutaan) gespoten worden (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Koorts en koude rillingen
- Overgevoeligheidsreactie (jeuk, rode huid, kortademigheid, lage bloeddruk)
- Matige misselijkheid en braken (tot 12 uur na toediening)

Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (1 tot 2 weken na toediening)
- Ontstoken mondslijmvlies (1 tot 2 weken na toediening)
- Vermoeidheid en vermindering van de eetlust (1 tot 14 dagen na toediening)
- Haaruitval
- Donkere verkleuring van de huidplooien en nagelbed
- Longbeschadiging

Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens de toediening van dit medicijn via een infuus, of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- Bij sommige patiënten kan er een overgevoeligheidsreactie optreden. Waarschuw de arts of verpleegkundige als u een van bovenstaande overgevoeligheidsreacties bij uw kind bemerkt.

Bijzonderheden:

- Dit medicijn kan longbeschadiging geven. Regelmatig zal er een longfoto gemaakt worden en/of een longfunctieonderzoek verricht worden ter controle.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.