

# CCNU

## Andere namen:

- Lomustine, CeCeNu

## Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een capsule die via de mond (oraal) ingenomen wordt.

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken

## Bijwerkingen op langere termijn:

- Ontstoken mondslijmvlies
- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes
- Haaruitval (soms)
- Lever- en nierbeschadiging

## Speciale instructies:

- Laat uw kind deze medicatie bij voorkeur 2 tot 3 uur na een maaltijd innemen, vlak voor het slapen gaan.
- Laat uw kind bij het innemen een hele beker vocht leegdrinken.
- Als uw kind binnen 30 minuten na het innemen van dit medicijn braakt, overleg dan met de verpleegkundige of de capsule opnieuw gegeven moet worden.

## Bijzonderheden:

- Regelmatig zal er bloed afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de lever en de nieren is.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.