

CISPLATINUM

Andere namen:

- Cisplatine, Platinol, CDDP, Platosin

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus in 1 tot 24 uur gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken (tot enkele dagen na toediening)
- Diarree
- Verlaging van het magnesiumgehalte in het bloed, met als gevolg spierkrampen en stuipen
- Overgevoeligheidsreactie (rusteloosheid, rood gezicht, kortademigheid, hoesten)

Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening)
- Nierbeschadiging
- Irritatie van de zenuwbanen, met als gevolg een 'doof' gevoel in of tintelende vingers en tenen
- Gehoorverlies

Speciale instructies:

- Waarschuw de arts als er een verandering in het gehoor van uw kind optreedt en/of als uw kind klaagt over oorsuizen.
- Bij sommige patiënten kan er een overgevoeligheidsreactie optreden. Waarschuw de arts of verpleegkundige als u een van bovenstaande overgevoeligheidsreacties bij uw kind bemerkt.

Bijzonderheden:

- Dit medicijn kan nierbeschadiging geven. Voor, tijdens en na de toediening wordt bijgehouden hoeveel vocht er opgenomen en uitgescheiden wordt. Regelmatig zal er bloed en urine afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de nieren is en hoe het magnesiumgehalte is.
- Dit medicijn kan doofheid veroorzaken. Regelmatig zal een gehoortest worden afgenomen ter controle.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.