

CYCLOFOSFAMIDE

Andere namen:

- Cyclo, Endoxan, CTX

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een tablet of capsule die via de mond (oraal) moet worden ingenomen.
- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus in 1 tot 24 uur gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken (bij intraveneuze toediening)
- Metaalachtige smaak in de mond tijdens en vlak na toediening

Bijwerkingen op langere termijn:

- Ontsteking van de blaas met bloederige urine
- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening)
- Haaruitval
- Onstoken mondslijmvlies
- Donkere verkleuring van de huid

Speciale instructies:

- De tabletten bij voorkeur 's morgens laten innemen.
- Als uw kind na het innemen van dit medicijn braakt (binnen 30 minuten), overleg dan met de verpleegkundige of de tablet opnieuw gegeven moet worden.
- Zorg voor een goede vochtopname en laat uw kind regelmatig plassen om irritatie van de blaas zoveel mogelijk te voorkomen.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over pijn bij het plassen en/of als u bloed in de urine ziet.
- Om de metaalachtige smaak die kan optreden tijdens het inspuiten van dit medicijn tegen te gaan, kunt u uw kind op een snoepje laten zuigen of kauwgom laten kauwen.

Bijzonderheden:

- Voor en na toediening wordt Mesna gegeven om blaasproblemen te voorkomen (afhankelijk van de dosering).

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.