

CYTOSAR

Andere namen:

- Cytosine-arabioside, Cytarabine, ARA-C, Alexan

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als bolusinjectie of langdurig als infuus gegeven wordt. Deze medicatie kan ook onder de huid (subcutaan) gespoten worden of via een lumbaalpunctie/Rickumdrain (intrathecaal) in de liquor gegeven worden (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Na toediening via een lumbaalpunctie kan er hoofdpijn ontstaan
- Huidveranderingen (roodheid, jeuk)

Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (7 tot 10 dagen na toediening)
- Ontstoken mondslijmvlies
- Griepachtige verschijnselen zoals spierpijn, koorts en hoofdpijn
- Bij hoge doseringen irritatie van de ogen (conjunctivitis)
- Haaruitval
- Leverbeschadiging

Speciale instructies:

- Indien hoge doseringen gegeven worden, kan irritatie van de ogen (conjunctivitis) voorkomen worden door het preventief toedienen van oogdruppels.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als u huidveranderingen bij uw kind bemerkt of als uw kind over jeuk klaagt.

Bijzonderheden:

- Bij hoge doseringen kan naast koorts, uitslag en conjunctivitis ook loslaten van de huid van handpalmen en voetzolen voorkomen.
- Regelmatig zal er bloed afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de lever is.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.