

# DACARBAZINE

## Andere namen:

- DTIC-Dome, Deticene

## Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt.

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Metaalachtige smaak in de mond (tijdens en vlak na toediening)
- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt
- Vaatkrampen en pijn (tijdens het toedienen)

## Bijwerkingen op langere termijn:

- Griepachtige verschijnselen (koorts, pijn en moeheid)
- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (14 tot 28 dagen na toediening)
- Haaruitval

## Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over vaatkrampen of een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens toediening van dit medicijn via een infuus, of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- Om de metaalachtige smaak die op kan treden tijdens het inspuiten van dit medicijn tegen te gaan kunt u uw kind op een snoepje laten zuigen of kauwgom laten kauwen.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.