

# DACTINOMYCINE

## Andere namen:

- Actinomycine D, Lyovac Cosmegen

## Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een gele vloeistof die via een ader (intraveneus) als bolusinjectie in 3 tot 5 minuten of als infuus in 30 minuten gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt

## Bijwerkingen op langere termijn:

- Ontstoken mondslijmvlies (5 tot 10 dagen na toediening)
- Haaruitval
- Diarree
- Verlaging van het aantal rode en witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening)
- Verkleuring of roodheid van de huid in (eerder) bestraald gebied
- Pigmentatie van de huid
- Acne
- Leverbeschadiging

## Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens toediening van dit medicijn, of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd zonnebaden en gebruik een anti-zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
- De huid kan overgevoelig reageren op bruine pleisters.

## Bijzonderheden:

- Dit medicijn kan leverbeschadiging geven. Afhankelijk van de dosering zal er bloed afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de lever is.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.