

DAUNORUBICINE

Andere namen:

- Daunomycine, Rubidomycine, Cerubidine, Daunoblastina

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een rode vloeistof die via een ader (intraveneus) als bolusinjectie of als infuus gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Okergele tot roodverkleuring van de urine (gedurende de eerste 24 uur na toediening)
- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt

Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening)
- Ontstoken mondslijmvlies (1 tot 2 weken na toediening)
- Haaruitval
- Bij hoge doseringen kan dit medicijn op den duur beschadiging van de hartspier geven
- Lever- en nierbeschadiging
- Huidreactie van een (eerder) bestraald gebied

Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens de toediening van dit medicijn of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd zonnebaden en gebruik een anti-zonnebrandmiddel met hoge beschermingsfactor.

Bijzonderheden:

- Dit medicijn kan beschadiging van de hartspier geven. Er zal regelmatig een echocardiogram en/of electrocardiogram (ECG) ter controle gemaakt worden.
- Regelmatig zal er bloed afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de lever en de nieren is.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het best contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.