

# DEXAMETHASON

## Andere namen:

- Decadron, Dexa

## Wat is het:

- Een hormoon dat normaal ook door het lichaam wordt gemaakt. Het is ontstekingsremmend en vermindert overgevoeligheidsreacties. Het wordt ook gegeven bij ziekten zoals reuma, astma enz. In sommige gevallen kan het kankercellen doden en versterkt het de werking van bepaalde cytostatica.

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een tablet dat via de mond (oraal) wordt ingenomen.
- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) wordt ingespoten (afhankelijk van het protocol).

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Branderig gevoel in de maag.

## Bijwerkingen op langere termijn:

- Toename van de eetlust, gewichtstoename en het vasthouden van vocht waardoor een 'vollemaansgezicht' en een dikke buik ontstaat.
- Gedragsveranderingen, rusteloosheid, irritatie, agressief gedrag, soms slapeloosheid en depressies.
- Acne.
- Verhoging van de bloedsuikers en/of suiker in de urine.
- Verhoogde bloeddruk.
- Verminderde reacties bij een infectie.

## Speciale instructies:

- Tabletten tijdens de maaltijd innemen met water of melk. Dit kan helpen om het branderige gevoel te voorkomen.
- Als uw kind na het innemen van dit medicijn braakt (binnen 30 minuten), overleg dan met de verpleegkundige of de tablet opnieuw gegeven moet worden.
- Bij gebruik van Dexamethason de medicatie niet ineens stoppen. De Dexamethason moet langzaam verminderd worden, het zogenaamde uitsluipen.
- Door het gebruik van Dexamethason kunnen infecties versluierd worden.

## Bijzonderheden:

- De bijwerkingen verdwijnen langzaam als de Dexamethason wordt uitgesloten.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.