

# FLUDARABINE

## Andere namen:

- Fludara

## Wat is het:

- Een celdelingremmend medicijn (cytostaticum).

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een tablet die via de mond (oraal) wordt ingenomen.
- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als injectie of kortdurend infuus wordt gegeven.

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Koorts en rillingen
- Misselijkheid en braken
- Diarree

## Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte en rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening)
- Vermoeidheid en algehele malaise
- Ontstoken mondslijmvlies
- Vasthouden van vocht
- Tintelende vingers en tenen en verminderde spierkracht in handen en onderbenen
- Wazig zien
- Huiduitslag

## Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige wanneer u veranderingen aan de huid van uw kind bemerkt, zoals uitslag, blaren, blauwe plekken of bloedingen.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige wanneer uw kind symptomen van infectie heeft, zoals koorts en rillingen.
- Tijdens het gebruik van fludarabine mag uw kind niet ingeënt worden. Bespreek dit met de behandelende arts.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.