

# FLUOROURACIL

## Andere namen:

- 5-FU, 5-Fluorouracil, Efundix

## Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als bolusinjectie of als infuus gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Metaalachtige smaak in de mond (tijdens en vlak na de toediening)

## Bijwerkingen op langere termijn:

- Diarree
- Ontstoken mondslijmvlies (5 tot 10 dagen na toediening)
- Verlaging van het aantal rode en witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (10 tot 14 dagen na toediening)
- Nagelveranderingen
- Huidveranderingen (pigmentatie), vooral in het gezicht en op de handen
- Haaruitval
- Acne
- Kan beschadiging van de hartspier geven

## Speciale instructies:

- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd zonnebaden en gebruik een anti-zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
- Om de metaalachtige smaak die kan optreden tijdens het inspuiten van dit medicijn tegen te gaan, kunt u uw kind op een snoepje laten zuigen of kauwgom laten kauwen.

## Bijzonderheden:

- Dit medicijn kan beschadiging van de hartspier geven. Er zal regelmatig een echocardiogram en/of electrocardiogram (ECG) ter controle gemaakt worden.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.