

# GLIVEC

## Andere namen:

- Imatinib

## Wat is het:

- Een tyrosinekinase-remmend medicijn. Tyrosinekinasen zijn enzymen die een doel-eiwit in de cel kunnen activeren door een fosfaat aan tyrosine te koppelen.

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een tablet die via de mond (oraal) ingenomen wordt.

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken.

## Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte en rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes.
- Kans op infecties of bloedingen.
- Hoofdpijn en duizeligheid.
- Slapeloosheid.
- Ontsteking van het bindvlies van de ogen, verhoogde traanafscheiding, wazig zicht.
- Maagdarmklachten, diarree, verstopping, buikpijn, gebrek aan eetlust.
- Vochtophoping (meestal in de benen en rond de ogen, soms elders in het lichaam).
- Huid: uitslag, jeuk, gevoelsstoornis bijv. kriebelig gevoel.
- Spierspasmen en -krampen, spier- en gewrichtspijn.
- Vermoeidheid.
- Ontstoken mondslijmvlies.
- Leverafwijkingen.

## Speciale instructies:

- Om irritatie van het maagdkanaal te voorkomen, het medicijn bij de maaltijd innemen met een groot glas water.
- Bij gelijktijdig gebruik van fluconazol, dexamethason, rifampicyne of paracetamol kan de Glivec-concentratie in het bloed verhoogd of verlaagd zijn. Overleg daarover met de behandelend arts.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.