

IFOSFAMIDE

Andere namen:

- Holoxan

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus in 1 tot 24 uur gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Onrust, verwardheid en stuipen

Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening)
- Haaruitval
- Ontsteking van de blaas met bloederige urine
- Nierbeschadiging
- Kan beschadiging van de hartspeer geven

Speciale instructies:

- Laat uw kind regelmatig plassen om blaasproblemen te voorkomen.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over pijn bij het plassen en/of als u bloed in de urine ziet.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als u onrust of verwardheid bij uw kind bemerkt.

Bijzonderheden:

- Voor en na de toediening van dit medicijn wordt Mesna gegeven om blaasproblemen te voorkomen.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.