

METHOTREXAAT

Andere namen:

- MTX, Ledertrexate, Emthexate, Mexate

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere gele vloeistof die via een ader (intraveneus) of via een lumbaal/Rickumdrain (intrathecaal) gegeven wordt.
- Een tablet die via de mond (oraal) wordt ingenomen (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken (afhankelijk van de dosering)
- Diarree
- Hoofdpijn, braken of koorts (bij intrathecale toediening)

Bijwerkingen op langere termijn:

- Ontstoken mondslijmvlies (3 tot 5 dagen na toediening)
- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening)
- Haaruitval
- Overgevoeligheid voor licht van ogen en huid
- Lever- en nierbeschadiging
- Algemene malaise

Speciale instructies:

- Voor de Hoge Dosis-MTX (HD-MTX) wordt er gestart met het toedienen van Natrium Bicarbonaat en de pH controle van de urine. Tijdens en na de toediening wordt dit voortgezet.
- Na de toediening van MTX per infuus wordt er Leucovorin gegeven volgens een schema. Het is belangrijk dat men zich aan dit schema houdt.
- Sommige medicijnen, zoals aspirine, sinaspril, bepaalde vitaminepreparaten, bactrimel en bepaalde antibiotica, beïnvloeden en versterken de werking van de MTX. Deze mogen dan ook niet worden ingenomen vlak voor, gedurende en vlak na de kuur.
- MTX (oraal, via de mond) mag niet worden ingenomen met melk of melkproducten.
- Als uw kind na het innemen van dit medicijn braakt (binnen 30 minuten), overleg dan met de verpleegkundige of de tablet opnieuw gegeven moet worden.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens de toediening van dit medicijn of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.

- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd zonnebaden en gebruik een anti-zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.

Bijzonderheden:

- Regelmatig wordt er bloed afgenomen om de MTX-spiegel te bepalen.
- Regelmatig zal er bloed afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de lever en de nieren is.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.