

# MITOXANTRONE

## Andere namen:

- Novantrone

## Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een blauwe vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt.

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Blauw/groene verkleuring van de urine (dit kan een aantal dagen duren)
- Misselijkheid en braken

## Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (10 tot 21 dagen na toediening)
- Ontstoken mondslijmvlies
- Haaruitval
- Kan bij hoge doseringen beschadiging van de hartspier veroorzaken
- Lever- en nierbeschadiging

## Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens de toediening van dit medicijn, of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.

## Bijzonderheden:

- Dit medicijn kan beschadiging van de hartspier geven. Er zal regelmatig een echocardiogram en/of electrocardiogram (ECG) ter controle gemaakt worden.
- Regelmatig zal er bloed afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de lever en nieren is.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.