

NATULAN

Andere namen:

- Procarbazine, Ibenzmethylin, Methylhydrazine

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een tablet die via de mond (oraal) wordt ingenomen.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken (gedurende 1 tot 6 uur)
- Huidveranderingen (uitslag, jeuk)

Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (14 tot 18 dagen na toediening, gedurende 2 tot 3 weken)
- Tintelingen van vingers en tenen
- Rusteloosheid

Speciale instructies:

- Deze medicatie kan in combinatie met alcohol en bepaalde voedingsmiddelen (banaan, tomaat, yoghurt, kaas, chocolade, cola) reacties veroorzaken. Vraag naar een dieetlijst.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als u huidveranderingen bij uw kind bemerkt of als uw kind over jeuk klaagt.

Bijzonderheden:

- Vermijd tyraminehoudende voedingsmiddelen (zie boven).

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.