

# PREDNISON

## Andere namen:

- Di-adreson F of prednisolon voor injectie

## Wat is het:

- Een hormoon dat normaal ook door het lichaam gemaakt wordt. Het is ontstekingsremmend en vermindert overgevoeligheidsreacties. Het wordt ook gegeven bij ziekten zoals reuma, astma enz. In sommige gevallen kan het kankercellen doden en versterkt het de werking van bepaalde cytostatica.

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een tablet die via de mond (oraal) wordt ingenomen.
- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als bolus, of via een lumbaalpunctie/Rickumdrain (intrathecaal) in de liquor wordt gegeven (afhankelijk van het protocol).

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Branderig gevoel in de maag

## Bijwerkingen op langere termijn:

- Toename van de eetlust, gewichtstoename en het vasthouden van vocht waardoor een 'vollemaansgezicht' en een dikke buik ontstaat
- Gedragsveranderingen, rusteloosheid, irritatie, soms agressief gedrag, depressies en slapeloosheid
- Door het vasthouden van water kans op verhoging van de bloeddruk
- Verminderde reacties bij infecties
- Verhoging van de bloedsuikers en suiker in de urine
- Acne

## Speciale instructies:

- De tabletten smaken bitter. Ze mogen tijdens de maaltijd worden ingenomen met water of melk. Dit kan ook helpen om het branderige gevoel te voorkomen.
- Als uw kind na het innemen van dit medicijn braakt (binnen 30 minuten), overleg dan met de verpleegkundige of de tablet opnieuw gegeven moet worden.
- Bij gebruik van prednison de medicatie niet ineens stoppen. De prednison moet langzaam verminderd worden, het zogenaamde uitsluipen.
- Door het gebruik van prednison kunnen infecties versluierd worden.

## Bijzonderheden:

- Op de afdeling wordt regelmatig de urine op suiker en de bloeddruk gecontroleerd.
- De bijwerkingen verdwijnen langzaam als de prednison is uitgeslopen.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.