

RITUXIMAB

Andere namen:

- Mabthera

Wat is het:

- Een monokonaal antilichaam. Dat is een eiwit dat een ander uniek eiwit (antigeen genoemd) herkent en zich eraan bindt (immuuntherapie)

Hoe ziet het er uit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Koorts, rillingen
- Misselijkheid en braken
- Hoofdpijn
- Buikpijn
- Verlaging van de bloeddruk
- Benauwdheid

Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte en rode bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (7 tot 10 dagen na toediening)
- Spier- of gewrichtspijn
- Huiduitslag
- Angst, nervositeit, slapeloosheid
- Tintelingen of een doof gevoel in ledematen
- Hoesten
- Rode ogen
- Jeukende neus
- Zweten
- Smaakveranderingen

Speciale instructies:

- Bij sommige patiënten kan een overgevoeligheidsreactie optreden. De verpleegkundige controleert tijdens en na de intraveneuze toediening regelmatig bloeddruk, pols, ademhaling en temperatuur.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als u benauwdheid of huiduitslag bij uw kind bemerkt of als uw kind koude rillingen heeft.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.