

TAXOL

Andere namen:

- Paclitaxel

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus wordt gegeven.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Tijdens toediening een lagere hartslag
- Overgevoeligheidsreactie (hoge bloeddruk, kortademigheid, huiduitslag, roodheid van de huid)

Bijwerkingen op langere termijn:

- Ontstoken mondslijmvlies
- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (10 tot 18 dagen na toediening)
- Diarree
- Pijnlijke spieren en kaken
- Haaruitval

Speciale instructies:

- Bij sommige patiënten kan er een overgevoeligheidsreactie optreden. Waarschuw de arts of verpleegkundige als u een van bovenstaande overgevoeligheidsreacties bij uw kind bemerkt.

Bijzonderheden:

- Regelmatig zal hartslag en bloeddruk tijdens de toediening gecontroleerd worden door de verpleegkundige.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.