

# TEMOZOLOMIDE

## Andere namen:

- Temodal

## Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een tablet of capsule die via de mond (per os) wordt ingenomen.

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Obstipatie

## Bijwerkingen op langere termijn (afhankelijk van de hoogte van de te geven dosis)

- Remming van het beenmerg en daardoor verlaging van het aantal rode bloedlichaampjes (bloedarmoede), witte bloedlichaampjes (iets vatbaarder voor infecties) en bloedplaatjes (vertraagde bloedstolling)

## Speciale instructies:

- Tabletten of capsules eenmaal per dag met veel water op de nuchtere maag innemen.
- Mag uitsluitend met appelsap (30 ml) of appelmoes (30 gr) gemengd worden als het innemen met water moeilijk is.
- Bij braken na het innemen geen nieuwe dosis geven. De volgende dag de normale dosis geven (niet inhalen!)

## Bijzonderheden:

- Een kwartier voor toediening een tablet tegen misselijkheid innemen.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn zijn vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.