

VINBLASTINE

Andere namen:

- Velbe, Vinblastinesulfaat

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als bolusinjectie in 3 tot 5 minuten gegeven wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt.
- Misselijkheid en braken.

Bijwerkingen op langere termijn:

- Buikpijn, buikkrampen, obstipatie (verstopping).
- Irritatie van zenuwbanen met als gevolg tintelende vingers en tenen, pijn in de kaken en verminderende spierkracht in de onderbenen en de handen.
- Haaruitval.

Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens de toediening van dit medicijn of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd zonnebaden en gebruik een anti-zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
- Let goed op de stoelgang van uw kind.

Bijzonderheden:

- Het kan noodzakelijk zijn dieetmaatregelen te nemen of om uw kind laxantia te geven.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.