

VINCRISTINE

Andere namen:

- Oncovin, VCR

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als injectie of als 24-uursinfuus gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt
- Obstipatie (verstopping)

Bijwerkingen op langere termijn:

- Buikpijn, buikkrampen, obstipatie (verstopping)
- Haaruitval
- Irritatie van zenuwbanen, met als gevolg tintelende vingers en tenen, pijn in de kaken en verminderde spierkracht in de onderbenen en de handen
- Koorts

Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens de toediening van dit medicijn of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- Let goed op de stoelgang van het kind.

Bijzonderheden:

- Het kan noodzakelijk zijn dieetmaatregelen te nemen of uw kind een laxemiddel te geven.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.