

VINDESINE

Andere namen:

- Eldisine

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als bolusinjectie in 3 tot 5 minuten gegeven wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt
- Misselijkheid en braken
- Koorts en koude rillingen

Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (3 tot 5 dagen na toediening)
- Buikpijn, buikkrampen, obstipatie (verstopping)
- Irritatie van zenuwbanen, met als gevolg tintelende vingers en tenen, pijn in de kaken en verminderde spierkracht in de onderbenen en de handen.
- Haaruitval

Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens de toediening van dit medicijn, of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- Let goed op de stoelgang van uw kind.

Bijzonderheden:

- Het kan noodzakelijk zijn dieetmaatregelen te nemen of om uw kind een laxeermiddel te geven

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.