

VM-26

Andere namen:

- Teniposide, Vumon

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid en braken
- Overgevoeligheidsreactie (rillingen, koorts, hoesten, kortademigheid, roodheid van de huid, jeuk, verlaagde bloeddruk)

Bijwerkingen op langere termijn:

- Haaruitval
- Ontstoken mondslijmvlies
- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (3 tot 14 dagen na toediening)

Speciale instructies:

- Bij sommige patiënten kan er een overgevoeligheidsreactie optreden. Waarschuw de arts of verpleegkundige als u een van bovenstaande overgevoeligheidsreacties bij uw kind bemerkt.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.