

CLOFARABINE

Andere namen:

- Evoltra

Wat is het:

- Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum)

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een heldere, kleurloze oplossing die via een ader (intraveneus) als infuus wordt gegeven in 120 minuten.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Misselijkheid, braken en diarree
- Hoofdpijn
- Koorts
- Angst, rusteloosheid, prikkelbaarheid
- Blozen
- Jeukende en rode en/of schilferende huiduitslag, ook op handpalmen en voetzolen
- Duizeligheid en flauwvallen (verlaagde bloeddruk)

Bijwerkingen op langere termijn:

- Verlaging van het aantal witte bloedcellen
- Verhoogd risico op infecties en bloedingen
- Ontstekingen van de mond-, maag- en darmslijmvliezen
- Abnormaal menstruatiepatroon
- Verminderde eetlust
- Gehoorproblemen
- Onvruchtbaarheid
- Haaruitval

Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of de verpleegkundige als uw kind duizelig wordt of flauwvalt, en/of hoofdpijn krijgt.
- Laat uw kind voldoende drinken tijdens de toediening van clofarabine.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als u merkt dat uw kind minder gaat plassen en/of dat de urine donkerder wordt.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.