

IRINOTECAN

Andere namen:

- Campto, Iricam, Xavetta, Iritec, Jovadolin, Cetomedica, Narimed

Wat is het:

- Een celdeling- remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven:

- Een kleurloze tot lichtgele vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus wordt gegeven in 30-90 minuten.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):

- Diarree
- Zweten
- Buikpijn
- Tranende ogen of problemen met zien
- Veel speekselvorming

Bijwerkingen op langere termijn:

- Ernstige diarree
- Verlaging van het aantal rode en witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes
- Haarausval
- Misselijkheid en braken
- Obstipatie (verstopping)
- Koorts

Speciale instructies:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als uw kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel dat optreedt tijdens de toediening van dit medicijn of als de huid rood op pijnlijk wordt.
- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd zonnebaden en gebruik een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.

Bijzonderheden:

- Waarschuw de arts of verpleegkundige bij (ernstige) diarree.

De meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn staan vermeld op deze kaart. Als u een volledige lijst van mogelijke bijwerkingen wilt hebben, dan kunt u daarover het beste contact opnemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.