



Klaar met de behandeling, en dan?



Diagnose en behandeling

- Schrik
 - Angst
 - Uitzichtloos
 - Overleven
 - Beter worden
 - Hoop
 - Balans
-
- Lange termijn effecten



Einde therapie



- Opluchting
- Angst
- Verwerken
- Oppakken van het 'normale leven'
- Follow up: controles, blijft de ziekte weg

- Lange termijn effecten

De Later-poli

Wie?

- ip voor iedereen die een vorm van kinderkanker heeft gehad

Wanneer?

- ip vanaf 5 jaar na de diagnose

Wat?

- screening lange termijn effecten

Hoe?

- plan is afhankelijk van behandeling

Waar?

- net als de zorg gecentraliseerd in Utrecht (begane grond)



De Later-poli

Wanneer:

- vanaf 5 jaar na diagnose
- tot 18^e jaar 1x/jaar
- daarna variërend van 1x/jaar-5 jaar

De Later-poli: Wat en Hoe?

Lichamelijke lange termijn effecten(obv therapie)


- nierfunctie (bv bij ifosfamide)
- gehoor (bij cisplatin)
- echo cor (bij antracyclines)
- longfunctie (bij bleomycine)
- borstkanker screening (bij sommige patienten na bestraling thorax)
- fertiliteit
-

'Psychosociale' lange termijn effecten

- werk
- school
- verzekeringen
- vermoeidheid
- fertiliteit
-



De Later-poli: Waar?



De Later-poli: wetenschappelijk onderzoek

Doel:

- uitzoeken welke follow-up het beste is
 - met welke frequentie
 - informatie vergaren/verdelen
 - risicogroepen identificeren
-
- zo goed mogelijke overleving, met zo weinig mogelijk lange termijn effecten

Dus ook langer na de behandeling blijft er een relatie met het ziekenhuis